

AVERTISSEMENTS GRICOLES

EDITION GRANDES CULTURES



STATION
POITOU-CHARENTES

000161
S.R.P.V.

13, ROUTE DE LA FORET
86580 BIARD

Bulletin n° 318 (10/96) 23/05/96

MAIS
CEREALES

:
:

Sésamie, poursuite du vol
Campagnol, dégâts graves en cours

POIS : stade début à pleine floraison.

COLZA : stade G4

PUCERONS VERTS

PUCERONS CENDRES

Situation - Préconisation

Les populations augmentent lentement (temps défavorable). Intervenez aux seuils de :

- 30 pucerons/plante début floraison ;
- 50 pucerons/plante pleine floraison ;
- 100 pucerons/plante fin floraison.

Situation - Préconisation

On observe une régression sensible. Les seuils sont moins souvent atteints, (2 colonies au m²). Les traitements sont maintenant très rarement justifiés.

TORDEUSES

CECIDOMYIES DES SILIQUES

Situation - Préconisation

Premières captures sur la façade atlantique ; il est trop tôt pour intervenir.

Situation - Préconisation

Les siliques boursouflées, jaunes avec des asticots à l'intérieur sont assez nombreuses (jusqu'à 5 %), surtout dans les parcelles non traitées charançons des siliques, (voir dossier Avertel page 17). Il n'y a pas de lutte directe contre cet insecte.

MALADIES

ALTERNARIA

Situation - Préconisation

On trouve les premières taches d'anthracnose. Faites un point maladie sur vos parcelles avant d'intervenir et choisissez un produit mixte si nécessaire. La protection sera à renouveler 15 jours après le premier traitement en parcelles irriguées ou si le temps humide persiste.

Situation - Préconisation

On observe les premières taches d'alternaria sur feuilles. Intervenez dès que vous observez les premières taches sur siliques, (Avertel pages 15 et 16).

P.1.10

D360 5 40830

BnF
S&T